

Ficha Técnica



Auxym

Fabricado por



Características principales

Auxym es un bioestimulante foliar 100% de origen vegetal, proviene de extractos de plantas tropicales al 82%. Potencia el metabolismo de las plantas, tiene un gran efecto bioestimulante ante estrés abióticos, refuerza estados fenológicos como floración, cuaja y desarrollo de fruto.

Corrige deficiencias de Zinc y Cobre.

Autorizado por SAG para uso en agricultura orgánica.

Composición

Hierro:	0,57%	Carbono orgánico de origen vegetal	4%
Manganeso:	0,57%	Materia seca	15%
Boro:	0,46%		
Zinc:	0,46%		
Cobre:	0,23%		

Parámetros fisicoquímicos

Densidad a 20° C:	1.140 g/L
pH a 20° C en dilución 10%:	4,2
Formulación	Líquido
Aplicación:	Foliar

Contaminantes

Cadmio (Cd)	< 1,5 ppm
Cromo hexavalente (Cr)	< 2 ppm
Mercurio (Hg)	< 1 ppm
Níquel (Ni)	< 50 ppm
Plomo (Pb)	< 120 ppm
Arsénico (As)	< 40 ppm

Dosis recomendadas

Cultivo Dosis Momento de Aplicación

Nogal	lt/ha	Estado Fenológico
	1,0 a 1,5 (0,05% a 0,075%)	10% flor pistilada 60% - 80% flor pistilada Fruto tamaño arveja

*Dosis menores en var. Chandler, mayores en var. Serr

Cerezo	lt/ha	Estado Fenológico
	1,5 (0,10% a 0,15%)	Caída de pétalos
	1,5 (0,10% a 0,15%)	Caída de chaqueta
	3,0 (0,20% a 0,30%)	20% de frutos con inicio de endurecimiento de carozo (25 DDPF aprox.)

Ficha Técnica



Auxym

Fabricado por



Dosis recomendadas

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
---------	-------	-----------------------

Ciruelo D'ágen

lt/ha

1,5 (0,10% a 0,15%)

1,5 (0,10% a 0,15%)

3,0 (0,15% a 0,25%)

Estado Fenológico

Caída de pétalos

Caída de chaqueta

20% de frutos con inicio de endurecimiento de carozo

(50 DDPF aprox.)

Uva de mesa

lt/ha

1,0 a 1,5 (0,075% a 0,10%)

Objetivo en fruto

Condición raquis y alargar racimos

Cuaja y producción

Tamaño de fruto y uniformidad

Estado Fenológico

Prefloración (estado de piña)

Fin floración a cuaja

Inicio de crecimiento de fruto:

Crimson Sweet de 2 a 4 mm

Red Globe de 8 a 12 mm

Crimson Sweet de 6 a 8 mm

Red Globe de 12 a 16 mm

*Nota: Otras variedades consultar.

Uva Vinífera

lt/ha

0,75 a 1,0 (0,10% a 0,15%)

0,75 a 1,0 (0,10% a 0,15%)

Objetivo en fruto

Cuaja y producción

Desarrollo y uniformidad

Estado Fenológico

Prefloración

Fin floración a cuaja

Arándanos

lt/ha

0,75 (0,10% a 0,15%)

0,75 (0,10% a 0,15%)

Objetivo en fruto

Cuaja y retención:

Producción y uniformidad:

Estado Fenológico

Plena flor

Primeros frutos cuajados

Ficha Técnica



Auxym

Fabricado por



Origen Italia y USA

Dosis recomendadas

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación	
Cítricos	lt/ha	Objetivo en fruto	Estado Fenológico
	0,75 (0,10% a 0,15%)	Cuaja y retención:	Inicio de floración
	0,75 (0,10% a 0,15%)	Producción y uniformidad:	50% caída de pétalos
	3 (0,25% a 0,4%)	Tamaño de fruto	Ajuste de carga
Manzanas y peras	lt/ha	Objetivo en fruto	Estado Fenológico
	0,75 a 1,0 (0,7% a 0,1%)	Cuaja y retención:	100% flor
		Retención y uniformidad:	Caída de pétalos
		Uniformidad y producción:	Fruto cuajado
Hortalizas de fruto	lt/ha	Objetivo en fruto	Estado Fenológico
	0,50 a 1,0 (0,05% a 0,1%)	Cuaja y retención :	100% flor
		Uniformidad y producción:	Fruto cuajado
Papas	lt/ha	Objetivo	Estado Fenológico
	0,30 a 0,50 (0,1% a 0,2%)	Formación de Tubérculo:	3 a 4 hojas verdaderas
		Producción de Tubérculo:	15 días después de primera aplicación
Paltos	lt/ha	Objetivo	Estado fenológico
	0,75 a 1 (0,06% a 0,13%)	Reforzar floración y cuaja	Floración
	1 a 2 (0,08% a 0,025%)	Competencia brote-cuaja	Cuaja

Recomendaciones de uso

Agitar bien antes de usar. Efectuar una distribución homogénea de la dosis del producto por hectárea. Almacenar en lugar fresco y seco evitando luz solar directa sobre el producto Se recomienda aplicar temprano o tarde, evitando temperaturas altas y sin viento, para aprovechar el momento de máxima absorción de la planta.

Compatibilidad

Este producto puede mezclarse con las materias activas más comunes empleadas para la nutrición y/o protección de los cultivos recomendándose, siempre, una prueba previa de compatibilidad de la mezcla y/o fitotoxicidad. Incorporar al final del llenado de la cuba de tratamiento, manteniendo la mezcla en agitación.

Presentación

Envase de 1 litro y 5 litros.

Origen: Italia y Estados Unidos