

Ficha Técnica

Características principales

Auxym es una mezcla entre fertilizante inorgánico compuesto por más de un micronutriente (hierro, manganeso, boro, zinc, cobre) y bioestimulante no microbiano en base a extracto de plantas tropicales libre de OMG. Potencia el metabolismo de las plantas por lo que potencia la producción de una manera natural. Gracias a su aporte de nutrientes y compuestos orgánicos, fortalece el vigor del cultivo en etapas de alta demanda metabólica, promoviendo un desarrollo equilibrado durante floración, cuaja y crecimiento de frutos. Corrige deficiencias de Zinc y Cobre.

PRODUCTO AUTORIZADO PARA SU USO EN AGRICULTURA ORGÁNICA

Composición

% p/v

Extracto de plantas tropicales:	82
Materia seca:	15
Hierro (Fe):	0,57
Manganeso (Mn):	0,57
Boro (B):	0,46
Zinc (Zn):	0,46
Cobre (Cu):	0,23

Contaminantes

Parámetros fisicoquímicos

Cadmio (Cd)	0,1 mg/kg (LOQ: 0,1 mg/kg)	Presentación	Líquido en solución
Arsénico (As)	5,0 mg/kg	pH	4,2
Plomo (Pb)	0,5 mg/kg	Densidad	1.140 g/L
Mercurio (Hg)	0,1 mg/kg (LOQ: 0,1 mg/kg)		
Níquel (Ni)	1,0 mg/kg		
Cromo (Cr VI)	0,5 mg/kg		
<i>E. Coli</i>	Ausente		
<i>Salmonella spp.</i>	Ausente		

Cultivo

Dosis recomendada

Momento de aplicación

Nogal	1,0 a 1,5 (0,05% a 0,075)	10% flor pistilada
		60-80% flor pistilada
		fruto tamaño arveja
Cerezo	1,5 (0,10% a 0,15%) 1,5 (0,10% a 0,15%) 3 (0,20% a 0,30%)	Caída de pétalos
		Caída de chaqueta
		20% de frutos con inicio de endurecimiento de carozo (25DDPF aprox.)
Ciruelo- durazno- almendro	1,5 (0,10% a 0,15%) 1,5 (0,10% a 0,15%) 3 (0,20% a 0,30%)	Caída de pétalos
		Caída de chaqueta
		20% de frutos con inicio de endurecimiento de carozo (40DDPF aprox.)

Fabricado por

HELIO NATURE
Origen Italia

Ficha Técnica



Auxym

Fabricado por



Cultivo	Dosis recomendada	Momento de aplicación
Uva de mesa	1,0 a 1,5 (0,75% a 0,10%)	Pre floración
		Fin floración a cuaja
		Inicio de crecimiento de fruto
		<i>Crimson Sweet de 2 a 4 mm</i>
		<i>Red Globe de 8 a 12 mm</i>
Uva vinífera	0,75 a 1,0 (0,10% a 0,15%)	<i>Crimson Sweet de 6 a 8 mm</i>
		<i>Red Globe de 12 a 16 mm</i>
Arándanos	0,75 a 1,0 (0,10% a 0,15%)	Pre floración
		Fin floración a cuaja
Limón-Naranja	0,75 a 1,0 (0,10% a 0,15%) 3 (0,25% a 0,4%)	Plena flor
		Primero frutos cuajados
		Inicio de floración
Manzanas y peras	0,75 a 1,0 (0,7% a 0,1%)	50% caída de pétalos
		Ajuste de carga
		100% flor
Mandarina	3 (0,2%) 1 a 1,5 (0,07% a 0,15%) 1 a 1,5 (0,07% a 0,15%)	Caída de pétalos
		Fruto cuajado
		frutos sobre 18 mm
Paltos	0,75 a 1 (0,06% a 0,13%) 1 a 2 (0,08% a 0,025%)	30DDA
		30DDA
Kiwis	1 (0,08%)	Floración
		Cuaja
		Pre-flor
Avellanos	0,75 a 1 (0,05% a 0,07%)	Post-flor
		10-15 días después
		Floración
Frutillas y frambuesas	0,5 a 1 (0,063% a 0,125%)	Cuaja
		Retención
Hortalizas de fruto/hoja	0,5 a 1,0 (0,05% a 0,1%)	En cada floración
		100% flor
Papas	0,3 a 0,5 (0,1% a 0,2%)	Fruto cuajado
		3-4 hojas verdaderas
		15 DDA

Ficha Técnica



Auxym

Recomendaciones de uso

Agitar bien antes de usar. Efectuar una distribución homogénea de la dosis del producto foliar por hectárea. Almacenar en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente en bodegas de almacenaje, evitando luz solar directa sobre el producto. Se recomienda aplicar temprano o tarde, evitando temperaturas altas y sin viento, para aprovechar el momento de máxima absorción de la planta. Incorporar al final del llenado de la cuba de tratamiento, manteniendo la mezcla en agitación. Si se aplica en electrostática, agitar considerablemente y filtrar con malla fina.

Compatibilidad

Este producto puede mezclarse con las materias activas más comunes empleadas para la nutrición y/o protección de los cultivos recomendándose, siempre, una prueba previa de compatibilidad de la mezcla y/o fitotoxicidad. Ante cualquier duda contacte al departamento técnico de IN-PACTA.

Presentación

Envase de 1 litro y 5 litros.
Origen: Italia

Seguridad y peligrosidad

Fertilizante y Bioestimulante que contiene Ácido bórico (CAS 10043-35-3)

PELIGRO:

Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Procure, leer y aplicar todas las instrucciones de seguridad antes del uso.
Usar guantes y antiparras.
EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.
Guardar bajo llave.
Eliminar el contenido y recipiente conforme a la reglamentación nacional.

Sustancia que contribuye a la clasificación: Ácido bórico (CAS 10043-35-3)

Para mas detalle sobre el manejo de emergencias, consultar la hoja de seguridad del producto.

Fabricado por



Origen Italia y USA