

# Ficha Técnica

## Características principales

**SCUDO®** es una mezcla entre fertilizante inorgánico a base de un micronutriente (sulfato de cobre) y bioestimulante no microbiano que contiene péptidos vegetales (soja). Los péptidos confieren mayor resistencia al estrés abiótico, bajando el punto de congelamiento de la células, ayudando a aumentar el metabolismo de la planta, aumenta la apertura estomática en estrés salino o altas temperaturas. Corrige deficiencias de Cobre.

## PRODUCTO AUTORIZADO PARA SU USO EN AGRICULTURA ORGÁNICA

### Composición:

|                    | % p/v |
|--------------------|-------|
| Materia seca       | 50    |
| Péptidos vegetales | 16    |
| Cobre (Cu)         | 11,9  |

### Contaminantes:

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Cadmio (Cd):           | 0,5 mg/kg  |
| Arsénico (As):         | 5,0 mg/kg  |
| Plomo (Pb):            | 0,5 mg/kg  |
| Mercurio (Hg):         | 0,5 mg/kg  |
| Níquel (Ni):           | 1,0 mg/kg  |
| Cromo (Cr VI):         | 0,5 mg/kg  |
| Zinc (Zn):             | 80,0 mg/kg |
| <i>E. coli</i>         | Ausente    |
| <i>Salmonella spp.</i> | Ausente    |

### Parámetros físico-químicos:

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Presentación | Líquido en solución |
| pH           | 9                   |
| Densidad     | 1.320 g/L           |

## Dosis recomendadas

| Cultivo | Dosis | Momento de Aplicación |
|---------|-------|-----------------------|
|---------|-------|-----------------------|

|                                |                                   |                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Cerezos                        | 150 a 200 cc/HL<br>(0,15% a 0,2%) | Desde prefloración a cuaja; y en cualquier etapa del desarrollo del cultivo |
| Ciruelos, duraznos y almendros |                                   |                                                                             |
| Limón, naranja y mandarino     |                                   |                                                                             |
| Paltos                         |                                   |                                                                             |
| Kiwi                           |                                   |                                                                             |
| Avellanos                      | 150 a 200 cc/HL<br>(0,15% a 0,2%) | Desde prefloración a cuaja; y en cualquier etapa del desarrollo del cultivo |
| Manzanos y perales             |                                   |                                                                             |

SCUDO

# Ficha Técnica

## Dosis recomendadas

| Cultivo                             | Dosis                             | Momento de Aplicación                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Arándanos<br>Frambuesas y frutillas | 150 a 200 cc/HL<br>(0,15% a 0,2%) | Desde prefloración a cuaja y desarrollo vegetativo                        |
| Nogales                             | 150 a 200 cc/HL<br>(0,15% a 0,2%) | Desde inicio de brotación y en cualquier etapa del desarrollo del cultivo |
| Uva vinífera                        | 150 a 200 cc/HL<br>(0,15% a 0,2%) | Desde precosecha a envero                                                 |
| Uva de mesa                         | 150 a 200 cc/HL<br>(0,15% a 0,2%) | Desde precosecha a envero                                                 |
| Hortalizas fruta/hoja               | 150 a 200 cc/HL<br>(0,15% a 0,2%) | Según requerimiento del desarrollo de cultivo                             |

## Recomendaciones de uso

**Aplicación foliar:** para aplicaciones foliares agitar vigorosamente el envase antes de verter el producto en el estante de mezcla. Efectuar una distribución homogénea de la dosis del producto por hectárea. Almacenar en lugar fresco y seco evitando luz solar directa sobre el producto. Se recomienda aplicar en las horas más frescas del día para aprovechar el momento de máxima absorción de la planta. Incorporar al final del llenado de la cuba de tratamiento, manteniendo la mezcla en agitación. Para más información contactarse con equipo técnico de IN-PACTA.

## Compatibilidad

Este producto puede mezclarse con las materias activas más comunes empleadas para la nutrición y/o protección de los cultivos.

## Incompatibilidad

En caso de aplicaciones foliares, se recomienda realizar previamente una prueba para verificar posibles efectos físicos derivados de la mezcla.

## Presentación

Envase de 1 litro, 5 litros y 20 litros.

Origen: Italia



# Ficha Técnica

## Seguridad y peligrosidad

Fertilizante y Bioestimulante que contiene Gluconato de Cobre (CAS 527-09-3)

### ATENCIÓN:

Nocivo en caso de ingestión. Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos inmediatos y duraderos.

No respirar polvos o nieblas. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. Usar ropa de protección. Tratamiento específico (véase la Hoja de Datos de Seguridad). En caso de ingestión: buscar ayuda médica y enjuagarse la boca. En caso de contacto con la piel: lavar con abundante agua cualquier parte del cuerpo que haya tenido contacto con el producto. En caso de irritación cutánea o sarpullido: buscar ayuda médica. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. No dispersar en el medio ambiente. Recoger los vertidos. Eliminar el contenido y el recipiente conforme a la reglamentación nacional.

**Sustancia que contribuye a la clasificación:** Gluconato de Cobre (CAS 7758-98-7).

*Para mas detalle sobre el manejo de emergencias, consultar la hoja de seguridad del producto.*

SCUDO